

AUTEURS CITÉS

- BALACHOWSKY A. S., 1930. – Contribution à l'étude des coccides de France (3^e note). Coccides nouveaux ou peu connus de la faune de France. *Bulletin de la Société entomologique de France*, **1930** : 178-184.
- 1931. – Contribution à l'étude des coccides de France (5^e note). *Bulletin de la Société entomologique de France*, **1931** : 96-102.
- 1969. – Le genre *Amonostherium* Morr. & Morr. dans le bassin occidental de la Méditerranée (Hom. Coccoidea Pseudococcinae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, **74** : 145-152.
- BEN-DOV Y., 1994. – *A systematic catalogue of the mealybugs of the world (Insecta : Homoptera : Coccoidea : Pseudococcidae and Putoidae) with data on geographical distribution, host plants, biology and economic importance*. Andover, UK : Intercept, 686 p.
- BOTTNER P., LOSSAINT P., PEYRONEL A. & WAREMBOURG F., 1976. – Les sols de la vallée du Tavignano. 30 p. polycopiées.
- GOUX L., 1931. – Note sur les coccides (Hem. Coccidae) de la France. 1. Note préliminaire : Monophlebinae, Ortheziinae, Dactylopiinae, Eriococcinae. *Bulletin de la Société entomologique de France*, **1930** : 330-333.
- HARRIS K. M., 1968. – A systematic revision and biological review of the cecidomyiid predators (Diptera : Cecidomyiidae) on world Coccoidea (Hemiptera : Homoptera). *Transactions of the Royal Entomological Society of London*, **119** (13) : 401-494.
- KIEFFER J. J., 1898. – Synopse des cécidomyies d'Europe et d'Algérie décrites jusqu'à ce jour. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Metz*, **20** : 1-64.
- MEINANDER M., 1972. – A revision of the family Coniopterygidae (Planipennia). *Acta Zoologica Fennica*, **136** : 357 p.
- PANIS A., 1999. – Les prédateurs de la cochenille noire, *Saissetia oleae* (Olivier), en France (Hemiptera : Coccidae). *Annales de la Société entomologique de France*, (N.S.), **35** (supplément) : 410-415.

Pierre TAUZIN. – Nouvelle observation d'*Ochodaeus coomani* Paulian, 1945 (Col., Scarabaeoidea, Ochodaeidae)

Ochodaeus coomani Paulian, 1945, espèce bien particulière décrite du Vietnam (Hoa Binh, *locus typicus*, au Tonkin et aussi Saïgon), a été récoltée en Chine lors d'un piégeage nocturne aux UV dans la région du Sichuan, près de la localité de Wenchuan (1500 m) le 19 août 2002 (*S. Mourzine legit*, collection P. Tauzin), en compagnie de plusieurs spécimens d'une autre espèce intéressante du genre *Ochodaeus* Dejean, 1821, *O. grandiceps* Fairmaire, 1897.

Comme l'a indiqué PAULIAN (1945 : 186), l'espèce s'individualise nettement des autres espèces du genre *Ochodaeus* par la forme générale du corps, relativement long et parallèle, et se rapproche beaucoup des *Codocera* Eschscholtz, 1821, autre genre inclus dans la famille des Ochodaeidae Mulsant & Rey, 1871. Il ne semble pas toutefois que cela justifie la création d'un nouveau genre monospécifique.

O. coomani se caractérise aussi par la suture clypéo-frontale présentant une carène rectiligne située au niveau du bord antérieur des yeux, par la surface du pronotum à très dense granulation fine et homogène, par de nettes stries élytrales ponctuées alternant avec des interstries plans à dense ponctuation râpeuse, et par le dessus à dense et assez longue pubescence brun clair dressée.

L'espèce est donc à inscrire dans la liste des espèces de la faune paléarctique, dont la localité de Wenchuan fait indéniablement partie.

AUTEUR CITÉ

- PAULIAN R., 1945. – Coléoptères Scarabéides de l'Indochine, première partie. *Faune de l'Empire français*, **III**, 228 p.

(P. T. : 47 rue Mansart, F – 92170 Vanves <pitauzin@numericable.fr>)