



Péréginations bibliographiques dans l'œuvre du naturaliste angevin Pierre-Aimé Millet (1783-1873) et implications taxonomiques (Insecta, Hemiptera et Orthoptera)

Thomas CHERPITEL 

Groupe d'étude des invertébrés armoricains, 32 boulevard de la Gare, 44390 Nort-sur-Erdre, France.
E-mail: t.cherpitel@gretia.org

(Accepté le 12.I.2026 ; publié en ligne le 19.III.2026)

Citation. – Cherpitel T., 2026. Péréginations bibliographiques dans l'œuvre du naturaliste angevin Pierre-Aimé Millet (1783-1873) et implications taxonomiques (Insecta, Hemiptera et Orthoptera). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 131 (1) : 37-46. https://doi.org/10.32475/bsef_2394

Résumé. – L'œuvre de Pierre-Aimé Millet a été importante pour la connaissance du patrimoine naturel de l'ouest de la France au XIXe siècle, en particulier pour le département du Maine-et-Loire. Deux taxons d'Hémiptères décrits par cet auteur en 1850 sont néanmoins tombés dans l'oubli et les implications taxonomiques de cet oubli sont discutées. *Aphrophora bipunctata* Millet, 1850 (*nomen oblitum*) est mis en synonymie avec *A. major* Uhler, 1896 (*nomen protectum*), ce qui n'implique aucun changement de nom pour *A. bipunctata* Melichar, 1902 (Aphrophoridae). *Delphax variegatus* Millet, 1850 est mis en synonymie avec *Stenocranus longipennis* (Curtis, 1837) (Delphacidae). Enfin, une rectification est également apportée à l'année de description de *Decticus graciosus* Millet, 1865 (Orthoptera, Tettigoniidae).

Abstract. – **Bibliographic peregrinations in the work of the Angevin naturalist Pierre-Aimé Millet (1783-1873) and taxonomic implications (Insecta, Hemiptera and Orthoptera).** Pierre-Aimé Millet's work was important for our knowledge of the natural heritage of western France in the 19th century, particularly in the Maine-et-Loire department. Two Hemiptera taxa described by this author in 1850 have nevertheless fallen into oblivion, and the taxonomic implications of this oversight are discussed. *Aphrophora bipunctata* Millet, 1850 (*nomen oblitum*) is placed in synonymy with *A. major* Uhler, 1896 (*nomen protectum*), which does not entail any change of name for *A. bipunctata* Melichar, 1902 (Aphrophoridae). *Delphax variegatus* Millet, 1850 is placed in synonymy with *Stenocranus longipennis* (Curtis, 1837) (Delphacidae). Finally, a correction is also made to the year of description of *Decticus graciosus* Millet, 1865 (Orthoptera, Tettigoniidae).

Keywords. – Auchenorrhyncha, Cicadomorpha, Fulgoromorpha, Ensifera, taxonomy.

Le naturaliste Pierre-Aimé Millet est né le 30 avril 1783 à Angers, et mort le 18 juin 1873, à l'âge de 90 ans. Cet angevin consacra une grande partie de sa vie à l'étude des sciences naturelles, essentiellement dans le Maine-et-Loire. Il rédigea de nombreux travaux, dont les derniers furent signés sous le nom de « Millet de la Turtaudière ». Il s'intéressa notamment aux vertébrés (MILLET, 1828), à la paléontologie (MILLET, 1854b ; MILLET DE LA TURTAUDIÈRE, 1866) aussi bien qu'aux mollusques (MILLET, 1813, 1854a) et autres invertébrés (MILLET, 1847 ; MILLET DE LA TURTAUDIÈRE, 1870, 1872). Il consacra également deux importants volumes à décrire la faune, la flore et la géologie de nombreuses communes du Maine-et-Loire (MILLET DE LA TURTAUDIÈRE, 1864, 1865). Pour plus de détails sur la vie de ce naturaliste, plusieurs biographies et hommages peuvent être utilement consultés (BOREAU, 1874 ; PORT, 1876 ; BRAUD, 2005 ; PERREIN, 2012).

À sa mort, son herbier local et ses collections paléontologiques furent récupérées par le Jardin botanique d'Angers et par le muséum d'Angers respectivement (BOREAU,

1874 ; PORT, 1876). Comme le mentionna PERREIN (2012) : « *le devenir de ses collections entomologiques n'est pas documenté* ». Des spécimens ayant appartenu à P.-A. Millet sont peut-être présents dans les collections du muséum d'Angers ; cependant les collections anciennes (qui ne comportent pas souvent les indications de date et provenance et encore moins le nom du collecteur) ont subi les affres du temps au cours du XIX^e et jusqu'au début du XX^e siècle, et ont été largement modifiées ou complétées au fur et à mesure des dégradations (B. Mellier, comm. pers.). Cependant, dans le cadre de la rédaction des deux volumes de la Faune des invertébrés de Maine-et-Loire (MILLET DE LA TURTAUDIÈRE, 1870, 1872), P.-A. Millet a été en contact avec de nombreux entomologistes de son époque (MILLET DE LA TURTAUDIÈRE, 1870 : abréviations ; B. Mellier, comm. pers.), des spécimens ont peut-être été déposés ailleurs.

Dans ses travaux, P.-A. Millet a décrit de nombreux taxons, essentiellement des mollusques et en grande partie des fossiles (e.g. LANDAU *et al.*, 2016). Quelques taxons actuels de mollusques sont toujours valides à ce jour : *Anisus leucostoma* (Millet, 1813) (Planorbidae), *Tandonia rustica* (Millet, 1843) (Milacidae) et *Viviparus contectus* (Millet, 1813) (Viviparidae) (GARGOMINY *et al.*, 2011). Le cas de trois taxons d'insectes décrits par P.-A. Millet sont discutés ci-après, deux d'entre eux étant tout bonnement tombés dans l'oubli.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Ordre **Hemiptera** Linnaeus, 1758

Sous-ordre **Cicadomorpha** Evans, 1946

Famille **Aphrophoridae** Amyot & Audinet-Serville, 1843

Aphrophora major Uhler, 1896 (fig. 1-2)

Aphrophora major Uhler, 1896 : 286 (*nomen protectum*).

Syn. *Aphrophora bipunctata* Millet, 1850 : 44, **n. syn.** (*nomen oblitum*)

Syn. *Aphrophora alpina* Melichar, 1900 : 58.

Syn. *Aphrophora myricae* Edwards, 1926 : 52.

Le genre *Aphrophora* Germar, 1821 compte 94 espèces valides (DMITRIEV *et al.*, 2025a). Cinq espèces sont présentes en France métropolitaine (NAST, 1987 ; DELLA GIUSTINA & REMANE, 2001), toutes présentes dans l'ouest du pays : *A. alni* (Fallén, 1805), *A. corticea* Germar, 1821, *A. major* Uhler, 1896, *A. salicina* (Goeze, 1778) et *A. willemsi* Lallemant, 1946 (= *A. pectoralis* auct. non Matsumura, 1903 ; TISHECHKIN, 2023).

En 1850, MILLET décrit *A. bipunctata* en un petit paragraphe de huit lignes, en français, sur la base d'un nombre indéterminé de spécimens provenant de la commune du Theil-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), dans les « *marais de Ricordelle, situés*

APHROPHORA BIPUNCTATA, Millet. D'un roux fauve un peu pâle, uniforme, avec un gros point blanc ou blanchâtre sur chaque homélytre ; 11 à 12 millimètres.

Cet insecte remarquable a quelques rapports de forme et de couleur avec l'APHROPHORA RUSTICA, Fabr. ; mais sa taille plus grande et le gros point blanc sur chaque homélytre suffiront pour l'en distinguer. — Tout l'été, sur les roseaux et les carex des marais de Ricordelle, situés près du château de la Rigaudière, commune du Theil (Ille-et-Vilaine).

Fig. 1. – Description originale d'*Aphrophora bipunctata*, d'après MILLET (1850 : 44).




Fig. 2. – Habitus d'*Aphrophora major* Uhler, 1896. (Photographie Gernot Kunz).

près du château de la Rigaudière ». L'espèce était déjà citée de Maine-et-Loire — sans être nommée — dans MILLET (1849). Par la suite, MILLET DE LA TURTAUDIÈRE (1864) mentionna l'espèce à plusieurs reprises, notamment à la page 462 sous le nom d'« *Aphrophora punctata* (sic.) Millet ». L'espèce avait été observée dans la commune de Saint-Jean-de-la-Croix (Maine-et-Loire), sur *Salix alba*, et l'auteur rappelle la présence d'un point sur chaque élytre. Enfin, la dernière citation de l'espèce semble remonter au deuxième tome de la Faune des Invertébrés de Maine-et-Loire (MILLET DE LA TURTAUDIÈRE, 1872). Dans ce dernier ouvrage, deux autres *Aphrophora* sont signalés : « *A. Spumaria*, Germ. ; *Cicada spumaria*, Lin. ; *Cercopis spumaria*, Fab. » dont la description donnée correspond à *A. alni* et non à *Philaenus spumarius* (Linnaeus, 1758) ainsi qu'« *A. Rustica*, Fab. (*Cercopis*) ; *A. Salicina*, Tign. » qui semble bel et bien correspondre à *A. salicina* — le nom de *Cercopis rustica* Fabricius, 1775 correspond quant à lui au Cicadellidae *Aphrodes bicincta* (Schrank, 1776).

Le nom "*Aphrophora bipunctata* Millet, 1850" ne figure dans aucun catalogue ou référentiel à l'heure actuelle (METCALF, 1962 ; NAST, 1972, 1987 ; DELLA GIUSTINA & REMANE, 2001 ; DMITRIEV *et al.*, 2025a, 2025b).

Bien que la collection entomologique de P.-A. Millet soit introuvable, les spécimens d'*Aphrophora* spp. contenus dans les collections du Muséum d'histoire naturelle d'Angers ont été examinés. Il n'existe *a priori* aucune trace de spécimens d'*Aphrophora bipunctata*, ni même de spécimens ayant appartenu à P.-A. Millet, en particulier dans la boîte MHNAn.2022.0.2732, la seule à contenir des spécimens de ce genre. Le type ou les syntypes sont donc probablement perdus ou détruits.

La brève description donnée par MILLET (1850), en particulier la grande taille de l'insecte et la présence d'un point clair sur chaque élytre, correspond en tout point à celle d'*A. major* (UHLER, 1896 ; EDWARDS, 1926 ; HOLZINGER *et al.*, 2003 ; BIEDERMANN & NIEDRINGHAUS, 2009), taxon décrit postérieurement à partir de spécimens provenant du Japon (UHLER, 1896). Notons également qu'*Aphrophora alpina* Melichar, 1900, décrit

d'Autriche, est cité de France par DELLA GIUSTINA & REMANE (2001), qui se questionnaient sur la validité de ce taxon sur la base d'auteurs non cités. Il est admis qu'*A. alpina* est bel et bien un synonyme junior d'*A. major* (VILBASTE, 1980 ; KOMATSU, 1997 ; LIANG, 1998 ; TISHECHKIN, 2023 ; DMITRIEV *et al.*, 2025b). Enfin, *A. myricae* Edwards, 1926, a été décrit d'Angleterre ; il était un synonyme junior d'*A. alpina* (NAST, 1972) et est donc également un synonyme junior d'*A. major* (KOMATSU, 1997 ; DMITRIEV *et al.*, 2025b).

Concernant *A. bipunctata* Millet, le principe de priorité est abandonné ici au profit d'*A. major* selon l'article 23.9 (inversion de la préséance) du Code International de Nomenclature Zoologique (ICZN, 1999). En effet, le nom *A. bipunctata* n'a semble-t-il pas été utilisé depuis 1899 et le nom *A. major* a été utilisé dans « au moins 25 travaux publiés par au moins 10 auteurs au cours des 50 ans immédiatement précédents, et couvrant une période d'au moins 10 ans » (e.g. VILBASTE, 1980 ; HAYASHI & HIGASHIKAWA, 1997 ; KOMATSU, 1997 ; LIANG, 1998, 2000 ; DELLA GIUSTINA & REMANE, 2001 ; NICKEL & REMANE, 2002 ; HOLZINGER *et al.*, 2003 ; LÖCKER, 2003 ; NICKEL, 2003 ; PILARCZYK *et al.*, 2004 ; LIANG *et al.*, 2008 ; BIEDERMANN & NIEDRINGHAUS, 2009 ; SÖDERMAN *et al.*, 2009 ; DEN BIEMAN *et al.*, 2011 ; KUNZ *et al.*, 2011 ; MUSIK & TASZAKOWSKI, 2013 ; STÖCKMANN *et al.*, 2013 ; WILSON *et al.*, 2015 ; MÜHLETHALER *et al.*, 2016 ; SELJAK, 2016 ; FOSTER, 2019 ; VAN KLINK *et al.*, 2019 ; TRIVELLONE *et al.*, 2021 ; TISHECHKIN, 2023).

Aphrophora bipunctata Melichar, 1902

Aphrophora bipunctata Melichar, 1902 : 107.

Ce taxon a été décrit de l'ouest de la Chine et plus particulièrement du Sichuan (MELICHAR, 1902). Il est également cité des provinces de Fujian, Gansu, Guangdong et de Jiangsu (METCALF, 1962). Aucune autre information ne semble disponible depuis (e.g. NAST, 1972 ; DMITRIEV *et al.*, 2025c).

Compte tenu que *A. bipunctata* Millet est traité précédemment comme un *nomen oblitum*, le nom "*bipunctata*" reste disponible au sein du genre *Aphrophora*. Il ne s'agit donc pas ici d'un cas d'homonymie entre les deux taxons ; par conséquent, aucun acte nomenclatural n'apparaît nécessaire.

Sous-ordre **Fulgoromorpha** Evans, 1946

Famille **Delphacidae** Leach, 1815

Stenocranus longipennis (Curtis, 1837) (fig. 3-4)

Delphax longipennis Curtis, 1837 : 657.

Syn. *Delphax variegata* Millet, 1850 : 44, n. syn.

Delphax variegatus a été décrit dans un paragraphe de dix lignes, en français, en 1850, de la même localité-type qu'*Aphrophora bipunctata* Millet, 1850. Il était également déjà mentionné du Maine-et-Loire en tant que « *Delphax* (espèce nouvelle) » par MILLET (1849). Par la suite, il est cité une fois dans MILLET DE LA TURTAUDIÈRE (1864), ainsi que dans la Faune des Invertébrés de Maine-et-Loire (MILLET DE LA TURTAUDIÈRE, 1872). DANS MILLET DE LA TURTAUDIÈRE (1872), *D. variegatus* est cité au côté de deux autres Delphacidae, *Asiraca clavicornis* (Fabricius, 1794) ainsi qu'un autre supposé *Delphax* Fabricius, 1798, « *D. Flavescens*, Fab. ». Ce nom correspond à *Fulgora flavescens* Fabricius, 1794, synonyme de *Javesella (Javesella) pellucida* (Fabricius, 1794) (DMITRIEV *et al.*, 2025d). Cependant, aucune description de l'insecte n'est donnée en dehors de sa taille — 6 mm — bien trop importante pour qu'il s'agisse de *J. pellucida* (même un individu macroptère).

DELPHAX VARIEGATA, Millet. Une ligne longitudinale blanchâtre sur le prothorax, la tête, et prolongée sur le bec. A partir du dessus de la tête jusqu'à l'extrémité du bec, cette ligne blanchâtre est bordée, de chaque côté, d'une ligne noire. Homélytres cristallines, opaques, d'un noir brillant, bordées de jaunâtre sur les bords internes et externes. Cette bordure ne s'étend pas sur le dernier tiers de l'aile. Pattes antérieures et intermédiaires annelées de noir et de blanc jaunâtre ; les postérieures de cette dernière couleur, avec les cuisses marquées de noir. — Tout l'été, sur les mêmes plantes et dans les mêmes lieux que l'insecte précédent.

Fig. 3. – Description originale de *Delphax variegata*, d'après MILLET (1850 : 44).



Fig. 4. – Habitus d'un mâle de *Stenocranus longipennis* (Curtis, 1837) (Photographie Gernot Kunz).

Comme l'espèce précédente, le type ou les syntypes de *D. variegatus* sont également probablement perdus ou détruits. Aucun spécimen s'approchant des descriptions de Millet n'est présent dans les collections du muséum d'Angers (en particulier la boîte MHNAn.2022.0.2734).

La description de *D. variegatus* donnée par MILLET (1850) et reprise par MILLET DE LA TURTAUDIÈRE (1872) (en ajoutant une précision sur la taille de l'insecte, à savoir 6 mm) correspondant sans nul doute possible au mâle de *Stenocranus longipennis* (Curtis, 1837). En premier lieu, une taille de 6 mm est relativement importante chez les Delphacidae de France européenne et n'est connue que chez certains représentants des genres *Delphax* et *Stenocranus* Fieber, 1866. Ces deux genres renferment essentiellement des espèces hygrophiles. Enfin, les ailes noires bordées de jaune, les pattes antérieures et intermédiaires annelées de noir et de blanc jaunâtre et les pattes postérieures majoritairement claires sauf le fémur strié de noir permettent d'écarter

toutes les autres espèces françaises de ces deux genres (e.g. HOLZINGER *et al.*, 2003 ; DELLA GIUSTINA & BALASSE, 2019). *Stenocranus longipennis* présente un fort dimorphisme sexuel ; la femelle ne présente aucun de ces critères de coloration.

Rappelons à toute fin utile, que le genre *Delphax* fait partie de la sous-famille des Delphacinae Leach, 1815, alors que les *Stenocranus* font partie de la sous-famille des Stenocraninae Wagner, 1963.

Ordre **Orthoptera** Latreille, 1793

Sous-ordre **Ensifera** Chopard, 1920

Famille **Tettigoniidae** Krauss, 1902

Gampsocleis glabra (Herbst, 1786)

Locusta glabra Herbst, 1786 : 193.

Syn. *Decticus graciosus* Millet, 1865 : 254.

Ce taxon est toujours cité sous le nom de "*D. graciosus* Millet, 1870". Cependant, une première courte description a été donnée dès 1865 dans le second tome des indicateurs du Maine-et-Loire, à la page 254 (en note infrapaginale ; cf. fig. 5). La description a ensuite été étoffée dans le premier tome de la Faune des invertébrés de Maine-et-Loire de 1870. Ce taxon est un synonyme de *Gampsocleis glabra* (Herbst, 1786) (e.g. FINOT, 1890 ; CHOPARD, 1952), bien que des doutes aient été émis sur ce rattachement (DEFAULT, 1999).

REMERCIEMENTS. – Je remercie en premier lieu Benoît Mellier (Muséum des sciences naturelles d'Angers) pour ses recherches dans les collections du muséum ainsi que nos échanges relatifs à celles-ci et à P.-A. Millet, ainsi que pour sa relecture du manuscrit. Merci à Olivier Durand de m'avoir fourni une copie de l'article de Serge Braud de 2005. Merci également à Thibault Ramage, Antoine Mantilleri, François Dusoulier, Maxime Le Cesne et Adeline Soulier-Perkins pour nos échanges à propos du Code International de Nomenclature Zoologique. Enfin, je remercie Gernot Kunz de m'avoir permis d'utiliser ses clichés pour illustrer ce travail.

Insectes orthoptères.

Decticus verrucivorus (grillus, L.) (*Locusta verrucivora*, Fab.) ; la plaine de Montr.-Bell., parmi les blés, la luzerne, le sain-foin, etc.

Decticus graciosus. Millet (1) ; habite la plaine de Montreuil et celles de Doué, avec le Decticus verrucivorus.

Insectes névroptères.

Libellula fulva, Müll. ; bords du Thouet. Mai-juillet.

— **cancellata, L. ; ib.**

— **cœrulescens, Fab. ; bords du Thouet, ceux de la Dive. Mai-août.**

(1) Cette nouvelle espèce, de la taille environ du *D. griseus*, L., dont la teinte générale est d'un vert tendre, présente quatre points noirs ou noirâtres sur le prothorax, qui est lisse, et des taches et des points de même couleur sur les élytres. — Voy. au reste la description que nous donnons de cette espèce dans la deuxième partie de la *Faune de Maine et Loire* (orthoptères).

Fig. 5. – Description originale de *Decticus graciosus*, d'après MILLET (1865 : 254).

RÉFÉRENCES

- BIEDERMANN R. & NIEDRINGHAUS R., 2009. – *The Plant- and Leafhoppers of Germany. Identification key to all species*. Schöeßel : Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb - Fründ, 409 p.
- BOREAU A., 1874. – Notice biographique sur M. Millet – naturaliste. *Mémoires de la Société académique de Maine et Loire, sciences*, 30 : 1-6.
- BRAUD S., 2005. – Millet de la Turtaudière, un illustre naturaliste angevin. *Anjou Nature*, 1 : 3-4.
- CHOPARD L., 1952. – *Orthoptéroïdes. Faune de France* 56 (1951). Paris : Lechevalier, 359 p.
- CURTIS J., 1837. – *British entomology ; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland : containing coloured figures from nature of the most rare and beautiful species, and in many instances of the plants upon which they are found. Volume VII. Homoptera. Hemiptera. Aphaniptera*. London : printed for the autor.
- DEFAUT B., 1999. – *Synopsis des Orthoptères de France*. Matériaux Entomocénétiques, numéro spécial, 2^e édition, 87 p.
- DELLA GIUSTINA W. & REMANE R., 2001. – Compléments à la faune de France des Auchenorrhyncha : espèces et données additionnelles ; modifications à l'ouvrage de Nast (1987) (Homoptera). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 106 (3) : 283-302.
- DELLA GIUSTINA W. & BALASSE H., 2019. – *Les Delphacidae de France et des pays limitrophes (Hemiptera, Fulgomorpha)*. *Faune de France* n° 100. Paris : Fédération Française des Sociétés de Sciences naturelles, Tome 1, 432 p., Tome 2, 400 p.
- DEN BIEMAN K., BIEDERMANN R., NICKEL H. & NIEDRINGHAUS R., 2011. – *The Planthoppers and Leafhoppers of Benelux. Identification keys to all families and genera and all Benelux species not recorded from Germany*. Cicadina - Supplement 1. Schöeßel : Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb - Fründ, 120 p.
- DMITRIEV D. A., ANGELOVA R., ANUFRIEV G. A., BARTLETT C. R., BLANCO-RODRÍGUEZ E., BORODIN O. I., CAO Y.-H., CARA C., DEITZ L. L., DIETRICH C. H., DMITRIEVA M. O., EL-SONBATI S. A., EVANGELISTA DE SOUZA O., GJONOV I. V., GONÇALVES A. C., GONÇALVES C. C., HENDRIX S., MCKAMEY S., KOHLER M., KUNZ G., MALENOVSKÝ I., MORRIS B. O., NOVOSELOVA M., PINEDO-ESCATEL J. A., RAKITOV R. A., ROTHSCHILD M. J., SANBORN A. F., TAKIYA D. M., WALLACE M. S. & ZAHNISER J. N., 2025a. – *Aphrophora* Germar, 1821. World Auchenorrhyncha Database. TaxonPages. Disponible sur : <https://hoppers.speciesfile.org/otus/334/overview> (accès le 15.X.2025).
- DMITRIEV D. A., ANGELOVA R., ANUFRIEV G. A., BARTLETT C. R., BLANCO-RODRÍGUEZ E., BORODIN O. I., CAO Y.-H., CARA C., DEITZ L. L., DIETRICH C. H., DMITRIEVA M. O., EL-SONBATI S. A., EVANGELISTA DE SOUZA O., GJONOV I. V., GONÇALVES A. C., GONÇALVES C. C., HENDRIX S., MCKAMEY S., KOHLER M., KUNZ G., MALENOVSKÝ I., MORRIS B. O., NOVOSELOVA M., PINEDO-ESCATEL J. A., RAKITOV R. A., ROTHSCHILD M. J., SANBORN A. F., TAKIYA D. M., WALLACE M. S. & ZAHNISER J. N., 2025b. – *Aphrophora (Aphrophora) major* Uhler, 1896. World Auchenorrhyncha Database. TaxonPages. Disponible sur : <https://hoppers.speciesfile.org/otus/431/overview> (accès le 13.IV.2025).
- DMITRIEV D. A., ANGELOVA R., ANUFRIEV G. A., BARTLETT C. R., BLANCO-RODRÍGUEZ E., BORODIN O. I., CAO Y.-H., CARA C., DEITZ L. L., DIETRICH C. H., DMITRIEVA M. O., EL-SONBATI S. A., EVANGELISTA DE SOUZA O., GJONOV I. V., GONÇALVES A. C., GONÇALVES C. C., HENDRIX S., MCKAMEY S., KOHLER M., KUNZ G., MALENOVSKÝ I., MORRIS B. O., NOVOSELOVA M., PINEDO-ESCATEL J. A., RAKITOV R. A., ROTHSCHILD M. J., SANBORN A. F., TAKIYA D. M., WALLACE M. S. & ZAHNISER J. N., 2025c. – *Aphrophora (Aphrophora) bipunctata* Melichar, 1902. World Auchenorrhyncha Database. TaxonPages. Disponible sur : <https://hoppers.speciesfile.org/otus/379/overview> (accès le 13.IV.2025).
- DMITRIEV D. A., ANGELOVA R., ANUFRIEV G. A., BARTLETT C. R., BLANCO-RODRÍGUEZ E., BORODIN O. I., CAO Y.-H., CARA C., DEITZ L. L., DIETRICH C. H., DMITRIEVA M. O., EL-SONBATI S. A., EVANGELISTA DE SOUZA O., GJONOV I. V., GONÇALVES A. C., GONÇALVES C. C., HENDRIX S., MCKAMEY S., KOHLER M., KUNZ G., MALENOVSKÝ I., MORRIS B. O., NOVOSELOVA M., PINEDO-ESCATEL J. A., RAKITOV R. A., ROTHSCHILD M. J., SANBORN A. F., TAKIYA D. M., WALLACE M. S. & ZAHNISER J. N., 2025d. – *Javesella (Javesella) pellucida* (Fabricius, 1794). World Auchenorrhyncha Database. TaxonPages. Disponible sur : <https://hoppers.speciesfile.org/otus/62135/overview> (accès le 13.IV.2025).

- EDWARDS J., 1926. – On some new and little-known British Cicadina, with a table of the genus *Eupteryx*. *The Entomologist's Monthly Magazine*, **62** : 52-56.
- FINOT A., 1890. – *Faune de France. Insectes Orthoptères. Thysanoures et Orthoptères proprement dits*. Paris : Ed. Deyrolle, 322 p.
- FOSTER S., 2019. – Yorkshire Auchenorrhyncha - Part 1: Fulgoromorpha (planthoppers) and Cicadomorpha - Cercopoidea (froghoppers). *The Naturalist*, **144** : 137-143.
- GARGOMINY O., PRIÉ V., BICHAIN J.-M., CUCHERAT X. & FONTAINE B., 2011. – Liste de référence annotée des mollusques continentaux de France. *MalaCo*, **7** : 307-382.
- HAYASHI M. & HIGASHIKAWA O., 1997. – Homoptera-Auchenorrhyncha and Heteroptera (Insecta, Rhynchota) from Sugadaira, Central Honshu, Japan. *Bulletin of the Sugadaira Montane Research Center*, **14** : 15-56.
- HERBST J. F. W., 1786. – Fortsetzung des Verzeichnisses meiner Insektensammlung (p. 183-196). In : *Archiv der Insectengeschichte*. Herausgegeben von Johan Caspar Fuessly. Volumes 7 et 8. Zürich : Bey dem Herausgeber.
- HOLZINGER W. E., KAMMERLANDER I. & NICKEL H., 2003. – *The Auchenorrhyncha of Central Europe - Die Zikaden itteleuropas*. Volume 1 : Fulgoromorpha, Cicadomorpha exc, Cicadellidae. Leiden : Brill Publishers, 673 p.
- ICZN, 1999. – *International Code of Zoological Nomenclature*. 4th edition. London : The International Trust for Zoological Nomenclature, XXIX + 306 p.
- KOMATSU T., 1997. – A Revision of the Froghopper Genus *Aphrophora* Germar (Homoptera, Cercopoidea, Aphrophoridae) from Japan, Part 3. *Japanese Journal of Entomology*, **65** (3) : 502-514.
- KUNZ G., NICKEL H. & NIEDRINGHAUS R., 2011. – *Fotoatlas der Zikaden Deutschlands. Photographic Atlas of the Planthoppers and Leafhoppers of Germany*. Scheeßel : Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb – Fründ, 293 p.
- LANDAU B. M., VAN DER VOORT J. & JANSSEN A. W., 2016. – Notes on gastropod taxa (Mollusca) introduced by Millet de la Turtaudière (1827-1866), with an analysis of their possible validity today, with an additional note on the publication date of Nyst ('1881'). *Cainozoic Research*, **16** (1) : 35-49.
- LIANG A.-P., 1998. – Oriental and Eastern Palaearctic aphrophorid fauna (Homoptera: Aphrophoridae): taxonomic changes and nomenclatural notes. *Oriental Insects*, **32** (1) : 239-257. <https://doi.org/10.1080/00305316.1998.10433777>
- LIANG A.-P., 2000. – Lectotype Designations and Taxonomic Notes on P. R. Uhler's Japanese Cercopoidea (Homoptera) in the U.S. National Museum of Natural History. *Journal of the New York Entomological Society*, **108** (3-4) : 268-272.
- LIANG A.-P., JIANG G.-M. & SONG Z.-S., 2008. – Uhler Types of Aphrophoridae Newly Found in the Natural History Museum, London (Hemiptera: Cercopoidea). *Entomological News*, **119** (1) : 61-66. [https://doi.org/10.3157/0013-872X\(2008\)119\[61:UTOANF\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.3157/0013-872X(2008)119[61:UTOANF]2.0.CO;2)
- LÖCKER H., 2003. – Arborikole Zikaden-Gilden in Slowenien (Hemiptera, Auchenorrhyncha). *Beiträge zur Zikadenkunde*, **6** : 7-38.
- MELICHAR L., 1900. – Eine neue Art der Homopteren-Gattung *Aphrophora*. *Wiener Entomologische Zeitung*, **19** : 58-60.
- MELICHAR L., 1902. – Homopteren aus West-China, Persien und dem Süd-Ussuri-Gebiete. *Annuaire du Musée Zoologique de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg*, **7** (1-2) : 76-146.
- METCALF Z. P., 1962. – *General Catalogue of the Homoptera*. Fascicle VII. Cercopoidea. Part 3. *Aphrophoridae*. Baltimore : Waverly Press, 600 p.
- MILLET P.-A., 1813. – *Mollusques terrestres et fluviatiles, observés dans le Département de Maine et Loire*. Angers : L. Pavie, 82 p.
- MILLET P.-A., 1828. – *Faune de Maine et Loire, ou Description méthodique des animaux qu'on rencontre dans toute l'étendue du département de Maine-et-Loire, tant sédentaires que de passage; avec des observations sur leurs mœurs, leurs habitudes, etc., etc*. Tome premier et tome deuxième. Paris : Rosier et Angers : L. Pavie, 773 p.

- MILLET P.-A., 1847. – Recherches des Odonates ou Libellulidées de Maine et Loire. *Mémoires de la Société d'agriculture, sciences et arts d'Angers*, 6^e volume, 1^{re} livraison : 1-82.
- MILLET P.-A., 1849. – Géographie entomologique. Observations faites à ce sujet. *Mémoires de la Société d'agriculture, sciences et arts d'Angers*, 6^{ème} vol., partie 2 : 157-164.
- MILLET P.-A., 1850. – La Bretagne fournit-elle à l'entomologie française quelques espèces rares ? (p. 44) In : Le Gall N. J. M., de Blois A. & de Barthélemy A., *Congrès scientifique de France. Seizième session, tenue à Rennes en septembre 1849*. Tome I. Paris : Chez Derache, 405 p.
- MILLET P.-A., 1854a. *Mollusques de Maine et Loire ou Tableau méthodique, descriptif et indicatif des mollusques terrestres et d'eau douce observés à l'état vivant dans le département de Maine et Loire. Troisième édition revue, corrigée et considérablement augmentée*. Angers : Cosnier et Lachèse, 74 p.
- MILLET P.-A., 1854b. – Paléontologie de Maine-et-Loire comprenant, avec des observations et l'indication des diverses formations géologiques du département de Maine et Loire, un relevé des roches, des minéraux et des fossiles qui se rapportent à chacune d'elles. Angers : Cosnier et Lachèse, 187 p.
- MILLET DE LA TURTAUDIÈRE P.-A., 1864. – *Indicateur de Maine et Loire. Tome premier*. Angers : Cosnier et Lachèse, 754 p.
- MILLET DE LA TURTAUDIÈRE P.-A., 1865. – *Indicateur de Maine et Loire. Tome second*. Angers : Cosnier et Lachèse, 616 p.
- MILLET DE LA TURTAUDIÈRE P.-A., 1866. – *Paléontographie ou description des fossiles nouveaux du terrain tertiaire marin ou terrain miocène supérieur du département de Maine et Loire*. Angers : Cosnier et Lachèse, 36 p.
- MILLET DE LA TURTAUDIÈRE P.-A., 1870. – *Faune des Invertébrés de Maine-et-Loire comprenant les 2e, 3e et 4e embranchements du règne animal ou seconde partie de la faune de Maine-et-Loire. Tome premier*. Angers : E. Barassé, 371 p.
- MILLET DE LA TURTAUDIÈRE P.-A., 1872. – *Faune des Invertébrés de Maine-et-Loire comprenant les 2e, 3e et 4e embranchements du règne animal ou seconde partie de la faune de Maine-et-Loire. Tome second*. Angers : E. Barassé, 394 p.
- MÜHLETHALER R., TRIVELLONE V., VAN KLINK R., NIEDRINGHAUS R. & NICKEL H., 2016. – Kritische Artenliste der Zikaden der Schweiz (Hemiptera: Auchenorrhyncha). *Cicadina*, **16** : 49-87.
- MUSIK K. & TASZAKOWSKI A., 2013. – New data on some rare planthoppers and leafhoppers in Poland (Hemiptera: Auchenorrhyncha). *Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae*, **98** (2) : 265-271.
- NAST J., 1972. – *Palaearctic Auchenorrhyncha (Homoptera). An annotated check list*. Warszawa : Polish Scientific Publishers, 550 p.
- NAST J., 1987. – The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Europe. *Annales Zoologici Warszawa*, **40** : 535-661.
- NICKEL H., 2003. – *The leafhoppers and planthoppers of Germany (Hemiptera, Auchenorrhyncha): patterns and strategies in a highly diverse group of phytophagous insects*. Sofia – Moscow : Pensoft Publishers et Keltern : Goecke & Evers, 460 p.
- NICKEL H. & REMANE R., 2002. – Artenliste der Zikaden Deutschlands, mit Angabe von Nährpflanzen, Nahrungsbreite, Lebenszyklus, Areal und Gefährdung (Hemiptera, Fulgoromorpha et Cicadomorpha). *Beiträge zur Zikadenkunde*, **5** : 27-64.
- PERREIN C., 2012. – Millet Pierre-Aimé (1783-1873) (p. 556-557). In : *Biohistoire des papillons. Diversité et conservation des lépidoptères rhopalocères en Loire-Atlantique et en Vendée*. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 623 p.
- PILARCZYK S., GAJ D. & SZWEDO J., 2004. – Planthoppers and leafhoppers (Hemiptera: Fulgoromorpha, Cicadomorpha) of the national parks in Poland. *Wiadomości Entomologiczne*, **23** (suplement 2) : 99-109. [en polonais]
- PORT C., 1876. – Millet (Pierre-Aimé) (p. 677). In : *Dictionnaire historique géographique et biographique de Maine-et-Loire. Tome deuxième. Partie II*. Paris : Librairie J.-B. Dumoulin et Angers : Librairies Lachèse & Dolbeau, 384 p.
- SELJAK G., 2016. – New and little know plant- and leafhoppers to the fauna of Slovenia (Hemiptera: Fulgoromorpha and Cicadomorpha). *Acta Entomologica Slovenica*, **24** (2) : 151-200.
- SÖDERMAN G., GILLERFORS G. & ENDRESTÖL A., 2009. – An annotated catalogue of the Auchenorrhyncha of Northern Europe (Insecta, Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha). *Cicadina*, **10** : 33-69.

- STÖCKMANN M., BIEDERMANN R., NICKEL H. & NIEDRINGHAUS R., 2013. – *The Nymphs of the Planthoppers and Leafhoppers of Germany*. Schreeßel : Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb – Fründ, 419 p.
- TISHECHKIN D. Y., 2023. – Review of the *Aphrophora salicina* (Goeze, 1778) (Homoptera: Cercopoidea: Aphrophoridae) species group of Russia and adjacent territories with description of a new species. *Russian Entomological Journal*, **32** (3) : 253–260. <https://doi.org/10.15298/rusentj.32.3.01>
- TRIVELLONE V., ACHTZIGER R., FRÜND E., FUNKE L., HOLLIER J., HOLZINGER W. E., HUBER E., KUNZ G., MÜHLETHALER R., NICKEL H., NIEDRINGHAUS R., PANASSITI B., RAMSAY A., RÖSCH V., SELJAK G., VAN KLINK R. & POLLINI PALTRINIERI L., 2021. – Auchenorrhynchi ed eterotteri (Hemiptera) di ecosistemi naturali di rilevante valore in Cantone Ticino (Svizzera). *Bollettino della Società ticinese di scienze naturali*, **109** : 183–197.
- UHLER P. 1896. – Summary of the Hemiptera of Japan, presented to the United States National Museum by Professor Mitzukuri. *Proceedings United States Museum*, **xix** (1108) : 255–297.
- VAN KLINK R., DEN BIEMAN K., FUNKE L., DE HAAS M. C., HELBING F., HERWIG S., HUBER E., MALENOVSKÝ I., NICKEL H., NIEDRINGHAUS R., PONIATOWSKI D., RÖSCH V., SEYEN F. & WITSACK W., 2019. – Auchenorrhyncha and Psylloidea collected during the 25th Central European Auchenorrhyncha meeting, Arnhem, The Netherlands (Hemiptera: Auchenorrhyncha and Psylloidea). *Cicadina*, **18** : 43–58.
- VILBASTE J. 1980. – *Fauna tsikadovykh Tuvy*. Tallinn : Valgus Publishing, 218 p.
- WILSON M., STEWART A., BIEDERMANN R., NICKEL H. & NIEDRINGHAUS R., 2015. – *The Planthoppers and Leafhoppers of Britain and Ireland. Identification keys to all families and genera and all British and Irish species not recorded from Germany*. Cicadina - Supplement 2. Schreeßel : Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb – Fründ, 138 p.
-